


نیوٹرنگ - خصی کرنا بلیوں کے لیے خاندانی منصوبہ بندی



کیٹس پروٹیکشن بلیوں کا تحفظ کرنے والی تنظیم
ضروری راہنمائی کا کتابچہ 6



کیٹس پروٹیکشن کا یہ یقین ہے کہ آپ کا اپنی بلی کو اس سے پہلے کہ اُس کے ہاں بچے پیدا ہوں خصی کروانا ایک ذمہ دار مالک ہونے کا ایک اہم حصہ ہے۔ بلیوں کے ہاں بُت بچے ہوتے ہیں اور اُن کی تعداد اس امر پر منحصر ہوتی ہے کہ اُن کے لینے کتنی خوراک اور پناہ کی جگہ دستیاب ہے۔ نیوٹرنگ یعنی خصی کرنے کے عمل کے بغیر برطانیہ میں بلیوں کی آبادی تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ برائے مہربانی کوشش کیجئے کہ پہلے ہی سے ہزاروں غیر مطلوبہ بلیوں کی تعداد میں مزید اضافہ نہ ہو۔ آبادی میں بُت زیادہ اضافہ بلیوں میں وائٹ بیماریوں، پریشان حالی سے متعلقہ بیماریوں اور بلیوں میں لڑائیوں کا باعث بنتا ہے اور اُن کی فلاح و بہبود پر منفی اثرات کا باعث بنتا ہے۔

نیوٹرنگ یعنی خصی کرنا کیا ہوتا ہے؟

نیوٹرنگ ایک جراحی آپریشن ہوتا ہے جس کی مدد سے مادہ بلیوں، جن کو کوئین کہا جاتا ہے اور نر بلیوں، جن کو ٹام کہا جاتا ہے، کو خصی کیا جاتا ہے تاکہ مادہ بلیوں کو حمل نہ ہو سکے۔

- ایک مادہ بلی کا ہلکا سا آپریشن کر کے اُس کی اڈریز یعنی بیضہ دانی اور بچہ دانی نکال دی جاتی ہیں
- ایک نر بلی کے آپریشن کر کے اس کے فوطے نکال کر اس کو خصی کر دیا جاتا ہے

کیٹس پروٹیکشن عام طور پر یہ تجویز کرتی ہے کہ بلی کے بچوں کو چار ماہ کی عمر کے لگ بھگ خصی کروانا چاہئے۔ تاہم بلیوں کو کسی بھی عمر میں خصی کروایا جا سکتا ہے۔ خصی کروانے کا عمل (نیوٹرنگ) غیر ضروری حمل سے نمپٹنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار ہے جو مسئلے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا حل ہے۔ خصی کرنے کے عمل سے بلیوں میں سرطان اور دیگر بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے اور اُن کے گم ہونے یا لڑنے اور پیشاب چھڑکنے کے امکانات کم ہوں گے۔

نیوٹرنگ کب کی جائے؟

روایتی طور پر بلیوں کی چھ ماہ کی عمر میں نیوٹرنگ کی جاتی تھی۔ تاہم جدید ترین سائنسی تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے کم عمر میں، مثال کے طور پر آٹھ ہفتوں کے بعد، نیوٹرنگ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کیونکہ چھوٹی بلیاں چار ماہ کی عمر ہی میں جنسی بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں اس لیے کیٹس پروٹیکشن عام طور پر یہ تجویز کرتی ہے کہ بلی کے بچوں کی تقریباً چار ماہ یا اس سے کم عمر میں نیوٹرنگ کر دینی چاہئے۔

نیوٹرنگ کیوں کی جانی چاہئے؟

نیوٹرنگ کے عمل میں صحت کے نقطہ نظر سے کئی فوائد ہیں اور ساتھ ہی یہ برطانیہ میں غیر مطلوبہ بلیوں کی تعداد کو کم سے کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

غیر خصی شدہ 'مکمل' بلیاں؛

- کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ لڑنے کی وجہ سے زخمی ہوں اور ان کو بیماریاں لگیں جس کے نتیجے میں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ویٹ یعنی جانوروں کے ڈاکٹر کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے۔
- وہ غیر خصی شدہ بلیوں کی تلاش میں کئی میاںوں تک پھیلے ہوئے علاقے تک چلے جاتے ہیں اور سڑک پر حادثات اور زخمی ہونے کے خطرات مول لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کا اپنے پالتو بلیے سے رابطہ ٹوٹ سکتا ہے۔
- وہ بلیوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پیشاب کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے اپنے علاقے کی حدود بندی کرتے ہیں۔
- ان کو فوطے میں رسولی کے خطرات ہوتے ہیں۔
- وہ غصی شدہ بلیوں کی نسبت شکار کرنے کی بہتر صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ شکار کرنا ایک جنسی امر نہیں ہے۔
- ایک جنسی ساتھی نہ ملنے کی صورت میں وہ محرومی کی وجہ سے مایوسی اور دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔

اس کے برعکس خصی شدہ بلیاں؛

- کے باہر گھومنے پھرنے کے کم امکانات ہوتے ہیں جس سے ان کے سڑک پر حادثات کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔
- ان کے لڑنے کے خدشات کم ہوتے ہیں جس سے ان کے زخمی ہونے یا پھر بلیوں میں پائی جانے والی بیماریوں فیلائین امیونوڈیفنسی شینسی وائرس (FIV) یا فیلائین لیوکیمییا وائرس (FeLV) کے گلنے کے خطرات کم ہوتے ہیں۔
- ان کے پیشاب کا چھڑکاؤ کرنے کے کم امکانات ہوں گے۔
- اُنکے فوطے میں رسولی ہونے کے امکانات نہیں ہوتے ہیں۔
- وہ بہتر پالتو جانور ثابت ہوتے ہیں اور زیادہ 'گھریلو' ثابت ہوتے ہیں۔

غیر خصی شدہ 'مکمل' مادہ بلیاں:

- چار ماہ کی عمر سے کثرت سے حاملہ ہو جاتی ہیں۔
- اُن کے سال میں اکثر تین یا چار مرتبہ بیچے ہوتے ہیں۔ یہ بلیوں کی آبادی میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور مالک کے لیے زائد اخراجات کا باعث بنتا ہے اور خصوصی طور پر اگر حمل یا پیدائش کے دوران مسائل پیش آئیں۔
- جنسی صحبت کے موسم - جنوری سے اگست - کے دوران جب تک کہ وہ حاملہ نہ ہو جائیں ہر تین ہفتے بعد ساتھی بلیے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شور مچاتی اور آوازیں نکالتی ہیں۔
- اُن کو جنسی عمل اور صحبت کے ذریعے بیماریاں لگنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔
- اُن کو بچہ دانی اور بیضہ دانی اور میمری گھلینڈز یعنی پستان کے ریشوں کے سرطان کے علاوہ پائومیٹرا جو کہ بچہ دانی کی شدید انفیکشن کا نام ہے کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس خصی شدہ بلیاں:

- حاملہ نہیں ہوں گی، اس طرح اُن کے ہاں پیدا ہونے والی زائد بلیوں کے اخراجات نہیں ہوں گے۔
- غیر خصی شدہ بلیوں کی طرح شور نہیں مچاتیں اور نہ ہی آوازیں نکالتی ہیں، اور اس طرح مالک اور ہمسائیوں کے لیے قدرے پُر امن راتیں گزرتی ہیں
- اُنکو FIV اور FeLV جیسی بیماریوں کے لگنے کے خطرات کم ہوتے ہیں جو جنسی عمل اور کاٹنے سے پھیلتی ہیں۔
- اُن کو بچہ دانی اور بیضہ دانی کا سرطان نہیں ہو سکتا اور اُن کو میمری گھلینڈز یعنی پستان کے ریشوں کے سرطان کے بھی بُت کم خطرات ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر جب اُن کو ابتدا ہی میں خصی کر دیا جائے۔

غیر متوقع حمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بلیوں کے بچوں:

- کو بیماریاں لگنے کے خطرات ہوتے ہیں۔
- اُن کی دیکھ بھال کرنے اور ویٹ یعنی جانوروں کے ڈاکٹر کی خدمات کے قدرے خاصی اخراجات ہوتے ہیں، جو اُن بچوں کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں جب کہ پہلے ہی بُت سے بلیوں کے بیچے خریدنے کے لیے دستیاب ہیں۔
- وہ بے گھر ہو سکتے ہیں۔
- ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور غیر مطلوبہ بلی یا اُس کے بیچے کو ایک گھر ملنے سے محروم کر دیں کیونکہ اُن کو لینے والے گھروں کی کمی ہے اور بلیوں کے بیچے زیادہ ہیں۔

بُت سے مالکان کو علم نہیں ہوتا کہ 'باہر' کی کس بلیاں بلیے کے ساتھ اُن کے غیر خصی جانور نے صحبت کی ہے اور اس طرح وہ جان لیوا حد تک شدید نوعیت کی بیماریوں کے خطرات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ نر بلیے کی عادات کا ہونے والے بچوں کے رویے پر اثر پڑتا ہے۔ 'باہر' کی بلیاں بلیے کے ساتھ اُن کے غیر خصی جانور کی صحبت سے ایسے بلیے کے بیچے پیدا ہو سکتے ہیں جو گھریلو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کے قابل نہ ہوں۔

آپریشن

آپ کی بلی کو میٹرنری سرجری میں ایک دن کے لیے داخل کیا جائے گا اور اس آپریشن کے لیے اُس کو بے ہوش کیا جائے گا اس لیے آپریشن سے چند گھنٹے قبل کی مدت کے دوران اُن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جانا چاہئے۔ آپ کے ویٹ یعنی بلیوں کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اپنی بلی کو کب کھانے کو دینا چاہئے۔ بلیوں اور بلیوں دونوں کا اس سلسلے میں آپریشن مختصر نوعیت کا ہوتا ہے اور آپ جس دن اپنی بلی کو ویٹ کے ہاں چھوڑ کر آئیں گے اسی دن اُس کو آپریشن کے بعد گھر لا سکیں گے۔

اس کی تکمیل پر آپ کی بلی کے پیٹ کے ایک جانب ایک چھوٹا سا نشان ظاہر ہوگا جہاں سے آپریشن کرنے کے لیے پاؤں کا صفایا کیا گیا ، یہ بال چند ہفتوں میں واپس آگ آئیں گے۔ اُس کے جو ٹانگے لگے ہوں گے وہ اگر خود بخود تکمیل ہو جانے والے نہ ہوں تو اُن کو تقریباً 10 دن کے بعد نکالا جائے گا۔

بلیوں میں برداشت کی بُت اہلیت ہوتی ہے اور وہ بہت بہادر ہوتی ہیں - انسانوں سے بُت زیادہ - اور عام طور پر وہ آپریشن سے جلد ہی تندرست ہو جائیں گی۔ آپ کے ویٹ آپ کو ہدایات دیں گے کہ آپ اپنی بلی کے آپریشن کے بعد اُس کی کیسے دیکھ بھال کریں۔ بلیوں کے بچے حقیقت میں بڑی بلیوں کی نسبت جلد تندرست ہو جاتے ہیں۔ نیوٹرنگ کے عمل کے بعد آپ کی بلی کو کم خوراک کی ضرورت ہوگی کیونکہ جسمانی طور پر وہ کم سرگرم رہے گی اس لیے آپ کو اپنی بلی کی خوراک کا دہیان کرنا ہوگا کہ اُس کا وزن زیادہ نہ بڑھ جائے اور کو مٹاپے سے بچانے کے لیے اُس کی خوراک کو کم کرنا ہوگا۔ اس سے بھی آپ کے اخراجات میں کمی آئے گی۔

اس کی لاگت کیا ہوتی ہے؟

اس آپریشن کی لاگت مختلف ہوتی ہے اور اس امر پر منحصر ہے کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں۔ ایک نر بلی کے لیے اوسط لاگت £30 سے £60 اور ایک مادہ بلی کے لیے اوسط لاگت £40 سے £80 ہوتی ہے۔ آپریشن سے پہلے آپ کے ویٹ آپ کو بخوشی لاگت کا تخمینہ مہیا کریں گے اور ہم تجویز کریں گے کہ آپ کئی مختلف ویٹ کو فون کر کے اس کی لاگت کا پتہ کریں۔ اگر آپ بینیفٹ وصول کرتے ہوں یا آپ کی آمدنی بُت کم ہو تو کیٹس پروویکشن کچھ حالات میں بلی کے مالک کی مدد کر سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اس ویب سائٹ کو ملاحظہ کیجئے

www.cats.org.uk/neutering :

یا اس نمبر پر فون کیجئے: 03000 12 12 12

اپنی بلی کی نیوٹرنگ کے لیے ایک ویٹ کی تلاش کیجئے

اگرچہ تقریباً تمام ویٹ بلیوں کی نیوٹرنگ کرتے ہیں، مگر کچھ ویٹ بلی کی نیوٹرنگ چھ ماہ کی عمر سے قبل نہیں کرتے۔ تاہم جو ویٹ ایسا کر سکتے ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے جس کی وجہ امدادی تنظیموں کی حمایت ہے جیسا کہ برٹش سال اینمل ہیڈمرزی ایسوسی ایشن (BSAVA)۔ آپ کے قریب ترین ویٹ کے بارے میں جاننے کے لیے کیش پروٹیکشن کی اس ویب سائٹ کو ملاحظہ کیجئے

www.cats.org.uk :

کم عمری میں نیوٹرنگ کا عمل کئی سالوں سے بُت سے ممالک میں ایک معمول کی بات ہے جن میں امریکہ اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں اور اس کے ہاتھ اور موٹرو ہونے کا ایک ثابت شدہ ریکارڈ موجود ہے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس عمل کے بلیوں کی افزائش اور رویے پر کوئی منفی اثرات نہیں ہوتے۔ بہتر تکنیک اور جدید ادویات کی وجہ سے ماضی میں جراحی آپریشن کے بارے میں پائے جانے والی تشویشات اب بے بنیاد ہیں اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ بلیوں کے چھوٹے بچے بڑی بلیوں کی نسبت آپریشن کے بعد زیادہ تیزی سے تندرست ہو جاتے ہیں۔

نیوٹرنگ کے متعلق کہادتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے حقائق

- بلیاں چار ماہ کی عمر سے حاملہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں
- بلیوں کے بچوں کی نیوٹرنگ ایک ہاتھ پر طریقے سے چھ ماہ کی عمر سے قبل کی جاسکتی ہے
- بلی کے بچے کو خصی کرنے سے پہلے ایک دفعہ بچے جننے کا موقع دینے میں متعلقہ جانور کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں
- بلیوں میں حمل کی مدت صرف نو ہفتے ہوتی ہے اور ایک مادہ بلی بچوں کی پیدائش کے صرف چھ ہفتے بعد دوبارہ حمل کے لیے تیار ہو سکتی ہے
- ایک بلی سال میں باآسانی تین دفعہ بچے دے سکتی ہے اور ہر دفعہ اس کے پانچ سے چھ بچے ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح کیش پروٹیکشن کو 18 ایسے گھروں کی تلاش ہوگی جو بلیوں کو ہاتھ پر رکھ سکتے ہیں! اس طرح سے بچوں کی پیدائش متعلقہ بلی کے لیے بُت مشقت کا کام ثابت ہو سکتا ہے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
- ایک غیر خصی شدہ بلی صرف پانچ سالوں میں پُشت در پُشت 20,000 بچوں کی پیدائش کا سبب بن سکتی ہے۔ غیر خصی شدہ بلیاں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں بُت ماہر ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بغیر منصوبہ بندی کے غیر مطلوبہ حمل کے واقعات عام ہوتے ہیں۔
- خصی شدہ بلیاں ان میں سے نکالے ہوئے اعضا یا بچے پیدا کرنے کے مواقع کی کمی محسوس نہیں کرتے۔ وہ انسان نہیں ہیں!
- نیوٹرنگ کا عمل ایک مادہ بلی کے پیدائشی موسم، حمل یا دودھ پلانے کی مدتوں کے دوران بھی کیا جاسکتا ہے اور اس سلسلے میں بہترین طریقہ کار ایک ویٹ کے ساتھ بات کرنا ہے۔

اگرچہ بلیوں کے زیادہ تر مالکان اپنی بلیاں خصی کرواتے ہیں بد قسمتی سے بہت سے مالکان بلیوں کو خصی کروانے سے پہلے بچے پیدا کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے بلیوں کی آبادی میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیموں پر مزید بوجھ پڑتا ہے۔ برائے مہربانی اس امر میں تاخیر مت کیجئے اور آج ہی اپنے ویٹ کے ساتھ بات کر کے اپنی بلی کی نیوٹرنگ کے لیے اپوائنٹمنٹ بنائیے۔ اس سے آپ کی بلی کو فائدہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اُس کو تکلیف سے بچائے اور بلیوں کی آبادی کے اجتماعی مفاد کے لیے یہ آپ ایک اہم قدم اٹھائیں گے۔

اپنی بلی کے بارے میں انٹرنیٹ سے مزید جانئے

اپنی بلی کے نسلی پس منظر کو جاننے اور بلیوں کے رویوں کے بارے میں بہتر سمجھنے کے لیے ہمارے آن لائن سافٹ ویئر کا استعمال کیجئے۔

<http://learnonline.cats.org.uk/content/ufo> :

ہیٹرنری ہدایاتی کتابچے

ضروری ہدایاتی کتابچے

1. آرٹھرائٹس (جوڑوں کا درد)
2. مادہ بیٹوں میں پیشاب اور مٹانے کی بیماریاں - لور
3. ہیٹرنری ٹریٹ ڈیزیز (FLUTD)
3. ذیابیطس
4. بیٹوں میں خارش اور جلد کے مسائل
5. فیلائین پائڈووائرس (FPV) (ایک جراثیمی بیماری)
6. گردوں کی بیماری - ریٹال ڈیزیز
7. معذور بیٹیاں
8. ہائی بلڈ پریشر
9. فیلائین ایبونوڈیفی شینس وائرس (FIV)
- اور فیلائین لیکیمیا وائرس (FeLV)
10. فیلائین کرونا وائرس (FCoV) فیلائین انفیکشن (FIP)
11. دل کا مرمر اور دل کے امراض
12. ہائپرٹھائروڈزم
13. بیٹوں کا دمہ
14. دانتوں اور منہ کی صحت
15. مکھیاں اور دیگر کیرسے
16. بیٹوں کا فلو
17. وہائی بیماریاں اور انسدادی ٹیکے
18. پیٹ خرابی - تے اور دست
19. آپ اور آپ کے ویٹ یعنی جانوروں کے ڈاکٹر
20. بیٹیاں اور حاملہ عورتیں - Toxoplasmosis
- بیٹوں کے فضلے کے جراثیم کا خطرہ

کیش پروٹیکشن کے بارے میں مزید جاننے یا چندہ دینے کے لیے ہماری ویب سائٹ کو

ملاحظہ کیجئے: www.cats.org.uk

یا ہماری امدادی لائین پر فون کیجئے۔ 03000 12 12 12.

رجسٹرڈ چیریٹی: 203644 (انگلینڈ اور ویلز) اور SC037711 (سکاٹ لینڈ)

SEPT-13 CODE: 84006

